

수정 전
페이지 112

결과표 27. 정신건강 관련 상담 경험 비율(1년)

| 직 종 | 상담 경험자 수 ^c | | 전체 응답자에서의 비율(%) ^d | | 1년 정신장애 진단자에서의 비율(%) ^e | |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 추정값(명) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE |
| 정신건강의학과 의사 | 682,528 | 12.2 | 1.6 | 11.8 | 7.0 | 20.8 |
| 기타 정신건강전문가 ^a | 22,872 | 47.8 | 0.1 | 48.0 | 0.1 | 100.1 |
| 비 정신건강의학과 의사 | 46,399 | 51.9 | 0.1 | 52.0 | 0.1 | 100.0 |
| 한의사, 한약사, 침술사 | - | - | - | - | - | - |
| 일반 간호사(정신건강의학과 이외의 간호사) | - | - | - | - | - | - |
| 종교인 ^b | 9,123 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 99.1 |
| 무당 | - | - | - | - | - | - |
| 약사 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 760,921 | 11.6 | 1.8 | 11.1 | 7.4 | 19.7 |

a 기타 정신건강전문가는 임상심리사, 정신건강사회복지사, 정신건강간호사를 포함
b 종교인은 목사, 신부, 스님을 포함
c 상담 경험자 수는 「2021년 8월 기준 주민등록인구통계」의 만 18세 이상 만 79세 이하 인구수를 기준으로 모수 추정된 결과임
d 전체 응답자 대비 상담 경험자 수의 비율
e 지난 1년동안 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 우울장애, 불안장애 중 어느 하나라도 진단된 대상자 대비 상담 경험자 수의 비율
· RSE(Relative Standard Error) : 상대 표준 오차

수정 후

결과표 27. 정신건강 관련 상담 경험 비율(1년)

| 직 종 | 상담 경험자 수 ^c | | 전체 응답자에서의 비율(%) ^d | | 1년 정신장애 진단자에서의 비율(%) ^e | |
|-------------------------|-----------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| | 추정값(명) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE |
| 정신건강의학과 의사 | 682,528 | 11.8 | 1.6 | 11.8 | 7.0 | 20.2 |
| 기타 정신건강전문가 ^a | 36,715 | 40.1 | 0.1 | 40.2 | 0.5 | 60.7 |
| 비 정신건강의학과 의사 | 46,399 | 52.0 | 0.1 | 52.0 | 0.1 | 100.0 |
| 한의사, 한약사, 침술사 | - | - | - | - | - | - |
| 일반 간호사(정신건강의학과 이외의 간호사) | - | - | - | - | - | - |
| 종교인 ^b | 12,307 | 78.5 | 0.0 | 78.5 | 0.3 | 78.5 |
| 무당 | - | - | - | - | - | - |
| 약사 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 ^f | 760,921 | 11.3 | 1.8 | 11.3 | 7.5 | 19.4 |

a 기타 정신건강전문가는 임상심리사, 정신건강사회복지사, 정신건강간호사를 포함
b 종교인은 목사, 신부, 스님을 포함
c 상담 경험자 수는 「2021년 8월 기준 주민등록인구통계」의 만 18세 이상 만 79세 이하 인구수를 기준으로 모수 추정된 결과임
d 전체 응답자 대비 상담 경험자 수의 비율
e 지난 1년동안 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 우울장애, 불안장애 중 어느 하나라도 진단된 대상자 대비 상담 경험자 수의 비율
f '상담 직종'은 복수 응답 항목이므로 합계의 숫자(전체 상담 경험자 수)와 각 항목별(상담 직종별 경험자 수) 합계는 일치하지 않음
· RSE(Relative Standard Error) : 상대 표준 오차


수정 전
페이지 113

1년 동안 정신건강 상담 경험 비율



수정 후

1년 동안 정신건강 상담 경험 비율



수정 전
페이지 116


결과표 29. 진단군별 처음 상담한 정신건강 문제의 주제

| 주 제 | 전체 응답자 | | 진단군 ^a | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|
| | | | 알코올 사용장애 | | 니코틴 사용장애 | | 우울장애* | | 불안장애 | | 위 정신장애 중 어느 하나라도 해당되는 경우 ^b | |
| | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE |
| 우울증 | 3.5 | 8.6 | 7.4 | 15.6 | 5.4 | 22.3 | 31.4 | 9.0 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 9.4 |
| 조현병 | 0.0 | 70.8 | - | - | 0.1 | 100.3 | 0.3 | 70.9 | 0.1 | 100.1 | 0.1 | 70.8 |
| 불면증 | 0.3 | 22.6 | 0.5 | 48.5 | - | - | 1.5 | 36.1 | 1.2 | 41.2 | 0.7 | 29.1 |
| 자살 | 0.0 | 80.8 | - | - | - | - | 0.1 | 100.1 | - | - | 0.0 | 100.2 |
| 알코올 중독 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 |
| 공황장애 | 0.2 | 39.6 | 0.1 | 99.9 | 0.1 | 100.1 | 0.2 | 78.6 | 0.7 | 66.1 | 0.3 | 51.3 |
| 감정기복 | 0.2 | 32.7 | 1.3 | 43.1 | 0.7 | 78.4 | 2.4 | 37.8 | 0.6 | 49.1 | 0.7 | 35.6 |
| 분노조절 어려움 | 0.2 | 44.7 | 0.4 | 99.8 | 0.6 | 77.5 | 0.8 | 79.7 | 1.3 | 57.5 | 0.5 | 52.6 |
| 기억력 저하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 0.4 | 25.1 | 0.6 | 68.1 | 0.2 | 80.2 | 1.1 | 58.7 | 0.5 | 54.4 | 0.4 | 48.8 |

a 평생 동안 해당 정신장애로 진단된 적이 있는 대상자
b 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 우울장애, 불안장애 중 어느 하나라도 해당되는 경우
* 21년도 조사 항목에서는 양극성장애 항목이 제외되어, 주요우울장애와 기분부전장애를 합친 진단군을 우울장애라고 구분함
· RSE(Relative Standard Error) : 상대 표준 오차

수정 전
페이지 117

평생 정신장애 진단자의 처음 상담한 정신건강 문제



수정 후

결과표 29. 진단군별 처음 상담한 정신건강 문제의 주제

| 주 제 | 전체 응답자 | | 진단군 ^a | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|------------------|-------|----------|------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|------|
| | | | 알코올 사용장애 | | 니코틴 사용장애 | | 우울장애* | | 불안장애 | | 위 정신장애 중 어느 하나라도 해당되는 경우 ^b | |
| | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE | 비율(%) | RSE |
| 우울증 | 3.5 | 8.5 | 7.4 | 15.7 | 5.4 | 22.6 | 31.4 | 9.0 | 13.4 | 13.3 | 10.2 | 9.4 |
| 조현병 | 0.1 | 66.0 | - | - | 0.5 | 78.7 | 0.8 | 65.8 | 0.5 | 78.0 | 0.2 | 65.7 |
| 불면증 | 0.9 | 13.6 | 2.7 | 23.1 | 0.5 | 50.4 | 7.0 | 16.8 | 4.1 | 21.2 | 2.6 | 15.9 |
| 자살 | 0.4 | 28.7 | 1.3 | 37.3 | 1.0 | 71.6 | 4.5 | 32.4 | 1.9 | 54.5 | 1.3 | 32.4 |
| 알코올 중독 | 0.0 | 70.8 | 0.2 | 70.7 | - | - | 0.2 | 100.1 | - | - | 0.1 | 70.8 |
| 공황장애 | 0.6 | 20.4 | 0.8 | 43.7 | 1.2 | 44.1 | 4.8 | 24.7 | 3.8 | 24.9 | 1.7 | 22.1 |
| 감정기복 | 0.8 | 17.2 | 2.7 | 28.0 | 2.5 | 39.6 | 7.6 | 20.1 | 3.9 | 26.0 | 2.4 | 19.3 |
| 분노조절 어려움 | 0.5 | 23.6 | 1.8 | 37.6 | 1.3 | 51.3 | 3.3 | 33.1 | 2.9 | 31.1 | 1.5 | 25.9 |
| 기억력 저하 | 0.1 | 48.3 | 0.1 | 100.1 | - | - | 0.8 | 48.8 | 0.5 | 55.3 | 0.2 | 48.3 |
| 기타 | 0.6 | 20.9 | 0.6 | 68.2 | 0.2 | 80.1 | 3.3 | 35.2 | 2.1 | 38.5 | 1.1 | 31.3 |

a 평생 동안 해당 정신장애로 진단된 적이 있는 대상자
b 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 우울장애, 불안장애 중 어느 하나라도 해당되는 경우
* 21년도 조사 항목에서는 양극성장애 항목이 제외되어, 주요우울장애와 기분부전장애를 합친 진단군을 우울장애라고 구분함
· RSE(Relative Standard Error) : 상대 표준 오차

수정 후

평생 정신장애 진단자의 처음 상담한 정신건강 문제

